

آپاندیسیت

آپاندیسیت یک سافتار کوچک و لوله مانند است که به اولین قسمت روده بزرگ (کولون) متصل شده است. آپاندیسیت در بخش سمت راست شکم قرار گرفته است، برداشتن آپاندیس هیچ تغییری در عملکرد هضمی ندارد. آپاندیسیت به التهاب آپاندیس گفته می شود و زمانی که شروع می شود هیچ درمان دارویی موثری برای آن وجود ندارد پس آپاندیسیت یک اورژانس پزشکی محسوب میشود (زمانیکه فوراً درمان شود بیشتر بیماران بدون هیچ مشکلی بهبود می یابند اگر درمان به تأخیر بیافتد آپاندیسیت می تواند متلاشی و باعث عفونت و متی مرگ شود.

علت :

علت آپاندیسیت به انسداد داخل آپاندیس مرتبط است که مدفوع ، عفونتهای باکتریایی و یا ویروسی و در تعداد کمی از افراد تروما به شکم می تواند باعث انسداد آن شوند .

علائم :

درد شکم (اول طرف ناف و سپس به نامیه سمت راست شکم می رود) ، کاهش اشتها ، تهوع استفراغ ، یبوست یا اسهال ، ناتوانی در دفع گاز ، تب ، ورم شکم .

تشخیص :

با معاینه جسمی ، بررسی های آزمایشگاهی (CBC ، VIA) سونوگرافی

درمان :

جراحی درمان اصلی آن می باشد .

مراقبتهای پرستاری قبل از عمل جراحی :


۱. NPO نگهداشتن بیمار .
۲. شروع مملولهای وریدی .
۳. درمان آنتی بیوتیک .
۴. قرار دادن NGT در صورت فلج ایلائوس .
۵. فوئداری از دادن تنقیه به دلیل خطر پارگی روده .

مراقبتهای پرستاری بعد از عمل جراحی :

۱. بیمار در وضعیت نیمه نشسته قرار می گیرد (این وضعیت از وارد آوردن فشار بر شکم کاسته و درد را کم می کند).
۲. دادن مسکن نارکوتیک برای کاهش درد در ۲۴ ساعت اول بعد از عمل .
۳. مراقبت از زخم نامیه عمل و در صورت داشتن درن مراقبت از درن ،

توسیع عروق

علاقه جدار عروق (توسیع عروق) در بیماری



عروق گشاد کننده در بیماری

توسعه

توسیع عروق (Vasodilation) در بیماری
توسیع عروق، توسعه عروق است که در نتیجه
از گشاد شدن آنها و در نتیجه افزایش جریان
خون در عروق است. این فرآیند در بیماری
توسیع عروق (Vasodilation) در بیماری
توسیع عروق (Vasodilation) در بیماری

بخش VIP

توسعه

سرپرستار: سرکار خانم حیدری

سرپرستار و نرس (سرکار خانم حیدری)
(MSc) در زمینه مراقبت از بیمار و آموزش
در زمینه مراقبت از بیمار و آموزش
در زمینه مراقبت از بیمار و آموزش
در زمینه مراقبت از بیمار و آموزش

تهیه کننده: سجاد رضوی

توسعه

توسعه در زمینه مراقبت از بیمار و آموزش
در زمینه مراقبت از بیمار و آموزش
در زمینه مراقبت از بیمار و آموزش
در زمینه مراقبت از بیمار و آموزش

توسعه

توسعه در زمینه مراقبت از بیمار و آموزش

معمل عمل درن در صورت احتمال بروز

پریوتنیت (التهاب موضعی مفره

صفاق) در ممل جراحی قرار داده می

شود .
توسیع عروق (Vasodilation) در بیماری

۴. تعویض پانسمان و شستشوی زخم.

۵. طبق دستور پزشک کمک به راه

اندازی بیمار جهت فارغ شدن گاز از

شکم .
توسیع عروق (Vasodilation) در بیماری

توسیع عروق (Vasodilation) در بیماری

۱. مراقبت از بیمار و آموزش

۲. مراقبت از بیمار و آموزش

۳. مراقبت از بیمار و آموزش

۴. مراقبت از بیمار و آموزش

۵. مراقبت از بیمار و آموزش

۶. مراقبت از بیمار و آموزش

۷. مراقبت از بیمار و آموزش

۸. مراقبت از بیمار و آموزش