



مراقبت ها و توجهات لازم پس از جراحی آپاندیسیت

توصیه های ذیل دستورات کلی و عمومی می باشد چنانچه پزشک معالج شما بسته به شرایط خاص شما دستوری داده باشد که با موارد ذیل تطبیق نمی کند دستور پزشک معالج را انجام دهید .

۱. برای کاهش دوران نقاهت بیماری و بهبودی سریع تر مرتب راه بروید. (بعد از عمل)
۲. هفت روز پس از عمل جراحی جهت معاینه به پزشک معالج خود مراجعه نمایید .
۳. فعالیت طبیعی خود را ۲-۱ هفته پس از عمل از سر بگیرید و بطور مرتب راه بروید .
۴. علیرغم داشتن درد در ناحیه عمل سرفه خود را مهار نکنید. اینکار باعث تجمع ترشحات در ریه و آسیب به این عضومی شود.
۵. ۴۸ ساعت بعد از عمل استحمام کنید و نیاز به تعویض پانسمان ندارید و روی محل بخیه ها باز باشد.
۶. رژیم غذایی خاصی توصیه نمی شود و با دستورات دارویی مرخص می باشید .
نسخه خود را کنترل نمایید . داروها را در ساعت مشخص مصرف نمایید.
۷. در صورت قرمزی و ترشح و درد شدید در محل عمل و تب به پزشک مراجعه کنید .

کمیته آموزش به بیمار مرکز