

درمان

تمامی بیماران مبتلا با کاواز کی باید بستری شوند و برای پیشگیری از آسیب به عروق قلبی ، درمان با اینموگلوبولین داخل وریدی آغاز می شوند . باید اکوی قلب انجام شود ، همچنین آسپرین و آنتی اسید نیز جهت جلوگیری از سکته در بیمار تجویز می گردد .

مراقبت های پرستاری

- کنترل درجه حرارت
- بررسی صدای قلبی از نظر نارسایی قلبی
- معاینه چشم از نظر کونژکتیویت
- معاینه غشاهاي مخاطی از نظر التهاب
- بررسی اندامها از نظر ادم و قرمزی
- کنترل جذب و دفع
- رزیم غذایی نرم و مایعات که خیلی سرد و گرم نباشد
- کنترل وزن روزانه
- انجام حرکات انقباض و انبساط ماهیچه ها

علائم بیماری

تبی که به آنتی بیوتیک جواب نمی دهد و بیش از ۵ روز طول می کشد .

قرمزی هر دو چشم

مخاط دهان با لبهای ترک خورده
برجستگی غدد لنفاوی گردن به صورت یک طرفه
که دردناک نمی باشد .


دانه های قرمز رنگ روی پوست در هنگام شروع
بیماری

تورم پشت دست و پاها قرمزی که دردناک نیز
می باشد .



این بیماری با علت ناشناخته باعث التهاب عروق خونی در سرتاسر بدن می شود .

یکی از دلایل اصلی بیماری قلبی در کودکان بیماری کاواز اکی است که واگیردار هم نمی باشد .



در این بیماری عوامل عفونی ، عوامل محیطی ،
سم تولید شده توسط باکتری ها نیز ممکن است موثر
باشد .

آموزش های لازم جهت والدین علائم و نشانه های



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
بیمارستان حضرت علی ابن ابی طالب (ع)

کوازاکی



واحد آموزش به بیمار
پاییز ۱۳۹۸

(ویرایش دوم)

■ در صورت مشاهده علائم مسمومیت با آسپرین شامل : وزوز گوش ، سردرد ، سرگیجه ، کبودی بی دلیل ، خونریزی از بینی ، خلط خونی ، خون در استفراغ ، خون در مدفوع به پزشک مراجعه نمایید .

■ درد قلب ، گرفتگی قفسه سینه ، اندام های سرد و رنگ پریده ، درد شکم ، تهوع ، استفراغ ، بیقراری و گریه شدید

■ پرهیز از زدن واکسن های حاوی ویروس زنده ضعیف شده تا ۱۱ ماه پس از دریافت ایمنو گلوبولین وریدی

■ بی قراری کودک تا دو ماه بعد از اولین علامت ممکن است ادامه داشته باشد .



■ رنگ پریدگی دست و پا

■ سردی و پایین بودن درجه حرارت و گرفتگی عضلات بعد از بیدارشدن

■ درد مفاصل تا چند هفته ادامه دارد .

■ ثبت درجه حرارت و اطلاع به پزشک در صورت تب بالای ۳۸ درجه .