



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان

بیمارستان حضرت علی ابن ابی طالب (ع)

گاسترو آنتریت در کودکان



واحد آموزش به بیمار

پاییز ۱۳۹۸

ویرایش دوم

گاسترو آنتریت غیر عفونی

برخی از عوامل غیر عفونی ایجاد کننده گاسترو آنتریت عبارتند از :

۱. افرادی که بدنشان تحمل لاکتوز را ندارد با استفاده از غذاهایی که لاکتوز دارند مانند (شیرگاو) به این بیماری مبتلا می شوند . این افراد دچار آنتریت می شوند ولی علائم گاستریت ندارند .
۲. افرادی که دچار بیماری سلیاک می باشند با مصرف غذاهایی که دارای گلوتن هستند (گندم، گندم سیاه) گاسترو آنتریت می شوند .
۳. اسهال غیر عفونی معمولاً طول کشیده و تکرار شونده هستند و نیاز به بررسی دارند

راه پیشگیری :

رعایت بهداشت فردی و اقداماتی نظیر شستشوی دست ها میزان بروز این بیماری را کاهش می دهد .



نحوه انتقال بیماری

► از طریق آب و غذاهای آلوده

► استفاده مشترک از وسائل شخصی


► استفاده از شیشه جهت تغذیه کودکان و بهداشتی نبودن این شیشه ها یکی از مهمترین دلایل شیوع این بیماری در سطح جهان است .

► تماس فیزیکی با فرد آلوده



علل

ویروسها (روتاویروس) و گونه باکتریایی (ای کولای، سالمونلا، شیکلا) علل اولیه گاستروآنتریت هستند. در اکثر موارد علت گاستروآنتریت در کودکان از ویروسی به نام روتاویروس و در بزرگسالان نوروویروس می باشد.



کودکانی که با روتاویروس آلوده شده اند بین ۳ تا ۸ روز بهبودی می یابند و دهیدراتاسیون (کم آبی بدن) یکی از عوارض رایج آن است.

اگر غذایی به باکتری آلوده شود و چندین ساعت در دمای اتاق باشد باکتری ها چند برابر شده و خطر آلدگی برای مصرف کنندگان آن غذا را افزایش می دهد.

شروع علائم

اغلب علائم ونشانه ها بین ۱۲ تا ۷۲ ساعت پس از ابتلاء شروع می شود. اگر عامل ویروسی باشد، معمولاً تا یک هفته طول می کشد. بعضی علائم ویروسی ممکن همراه با تب و خستگی و سردرد باشد. اگر مدفوع خونی باشد احتمالاً عامل ویروسی نمی باشد و به احتمال زیاد باکتریایی یا انگلی است و عفونتهای باکتریایی ممکن است همراه با درد شدید شکمی باشد و هفته ها طول بکشد.



گاستروآنتریت چیست؟

گاستروآنتریت یا بیماری التهاب معده ای و روده ای که منجر به اسهال، استفراغ و دردشکم و گرفتگی عضلات می شود.

گاستروآنتریت در کودکان اغلب به صورت شروع اسهال با دردشکم و تب و استفراغ و تهوع می باشد. اسهال معمولاً به صورت دفع حداقل ۳ نوبت مدفوع شل یا آبکی در ۲۴ ساعت تعریف می شود. اسهالی که حداقل ۱۴ روز طول بکشد معمولاً ناشی از عفونتهای انگلی است در حالی که اسهال همراه با تغییرات عمومی معمولاً برای توکسین ها یا ویروس ها ایجاد می شود.



گزارش والدین از علایم کودک، به ارزیابی دهیدراتاسیون (کم آبی بدن) کمک می کند. وضعیت دریافت مایعات توسط کودک و میزان اسهال و استفراغ کودک از نظر بالینی اهمیت دارد.

در موارد خفیف می توان گاستروآنتریت را با آب رسانی مناسب از طریق مصرف ORS (او.آر.اس) کنترل نمود. در موارد شدیدتر از مایعات درون وریدی (سرم) استفاده می شود.