

تعریف: عبارت است از التهاب پرده مغز

انواع مننژیت: عفونی- غیر عفونی- سلی

نوع عفونی: به وسیله باکتری هایی نظیر نایسریا ایجاد میشود.

نوع غیر عفونی: ممکن است به دنبال سرطان یا ابلسه مغز ایجاد شود.

علت: عامل ایجاد کننده وارد جریان خون شده و از پرده های مغز عبور کرده و باعث التهاب میشود. بدون توجه به عامل ایجاد کننده مننژیت، عموماً عفونت های مننژ از دو راه پدید می آیند:

الف) از طریق جریان خون که سبب انتقال عفونت جاهای دیگر (عفونت سلول) به مغز می شوند.

ب) با انتقال مستقیم (یعنی پس از وارد شدن آسیب به استخوان یا ضربه) در بعضی موارد نیز به علت خود به خود یا بکار گیری وسایل و تجهیزات پزشکی ایجاد میشود.

مننژیت عفونی شایع ترین شکل مننژیت است. میکروبهای شایع شامل مننژیت مننگو کوکی استرپتوکوک پنومونی هموفیلوس انفلانزا می باشد.

راه انتقال: ناشی از تماس مستقیم شامل قطرات ریزدهان-بینی ترشحات بینی و گلو در افراد ناقل یا عفونی در مننژیت عفونی ابتدا به صورت عفونت دهانی حلقی ظاهر میشود یا عفونت خون که به سمت پرده های مغز گسترش می یابد.

تشخیص: گرفتن مایع نخاع و کشت مایع نخاع جهت تشخیص نوع میکروب

علائم: سردرد- تب شدید که غالباً نخستین نشانه محسوب میشود. تغییر در هوشیاری- عدم آگاهی و اختلالات حافظه که در مراحل ابتدایی است.

خواب الودگی- سفتی گردن و وقتی که پای بیمار را به طرف شکم خم کنیم دیگر قادر به باز کردن پاها به حالت اولیه نباشد.

حساسیت به نور- خم کردن سر بیمار که باعث خم شدن زانوها شده- حملات تشنج- افزایش فشار داخل جمجمه- دانه های قرمز روی پوست ظاهر میشود.

دانشگاه علوم پزشکی
رفسنجان

مننژیت

بیمار گرامی پمفلتی که در دست
دارید حاوی اطلاعات ضروری
در خصوص بیماری فعلی شما و
چگونگی درمان و روند مراقبت
ان میباشد.

منابع: پرستاری داخلی جراحی
برونر و سودارث

باشد جهت جلوگیری از انتشار
ترشحات دهانی بیمار

۵- به افراد خانواده در مورد
وضعیت بیماری آگاهی داده
شود و در فواصل مناسب از
بیمار عیادت کنند.

۶- پیشگیری از عوارضی که
در اثر عدم تحرک (زخم های
فشاری) ایجاد میشود.

۷- کنترل روزانه وزن و
الکتروولیت های سرم

۸- محافظت بیمار از آسیب
دیدگی های ناشی از تشنج یا
تغییرات هوشیاری

آموزش ضمن ترخیص:

استفاده به موقع داروها

انجام نوار گوش برای اطمینان
از عدم صدمه به پرده گوش

مراجعه به پزشک جهت ویزیت

پیشگیری: افرادی که در تماس
نزدیک با بیمار بوده اند را
تحت درمان قرار داده به
خصوص افرادی که با بیماران
مننژیت نوع عفونی تماس داشته
اند بایستی واکسینه شوند
پیشگیری شامل ایزوله کردن
بیمار استفاده از ماسک می
باشد.

درمان: شامل درمان ضد
میکروبی با استفاده از انتی
بیوتیک مناسب

اقدامات پرستاری:

۱- کنترل علائم حیاتی

۲- استفاده از اکسیژن در
صورت نیاز

۳- کنترل لب های بیمار از نظر
کبودی

۴- کنترل بیمار، تا ۷۲ ساعت
پس از شروع انتی بیوتیک