

گاستروآنتریت چیست؟

گاستروآنتریت عبارت است از آزردگی و عفونت لوله گوارش که غالباً می‌تواند باعث به هم خوردن ناگهانی و گاهی شدید وضعیت گوارشی شود. گاستروآنتریت ممکن است با کولیت اسپاستیک (اسپاسم و دردهای مزمن وعود کننده شکمی) اشتباه گرفته شود. در تمام سنین روزی می‌دهد اما در کودکان کم سن و سال (۱-۵ سال) و افراد بالای ۶۰ سال شدیدتر است.

علل بیماری:

✓ انواع مختلفی از ویروس‌ها، باکتری‌ها یا انگل‌ها که غذا یا آب را آلوده می‌کنند.
✓ مصرف مسهل‌های قوی
✓ تغییر در باکتری‌هایی که معمولاً در روده‌ها وجود دارند

✓ وجود سموم شیمیایی در بعضی گیاهان، غذاهای دریایی یا غذاهای آلوده
✓ مسمومیت با فلزات سنگین (سرپ، آلومینیوم، جیوه، مس) که از سموم پرخطر پیرامون ما می‌باشند.
این سموم در هوای تنفسی، آب آشامیدنی، مصالح ساختمانی، لوازم آشپزخانه و حتی البسه موجود می‌باشند.

برخی فلزات به مقدار ناچیز برای عملکرد طبیعی بدن ضروری می‌باشند اما ورود بیش از اندازه آنها به بدن مسمومیت ایجاد کرده و باعث اسهال و استفراغ می‌شود

علائم:

- ✓ تهوع و گاهی استفراغ
- ✓ بی‌اشتهاای
- ✓ تب
- ✓ ضعف
- ✓ دل‌پیچه

درد یا حساس بودن شکم هنگام لمس

اسهال که می‌تواند از روزانه ۲-۳ بار اجابت مزاج شل تا تعداد زیادی اجابت مزاج آبکی متغیر باشد



عوامل افزایش دهنده خطر:

- ✓ سن بالای ۶۰ سال
- ✓ نوزادان یا شیرخواران
- ✓ رژیم غذایی نامناسب
- ✓ دیابت، نارسایی کلیه، بیماری‌های قلبی

سوء مصرف الكل:

- ✓ مسافرت به مناطق نامناسب از نظر بهداشتی
- ✓ مصرف داروهایی مثل داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی، آنتی بیوتیکها، مسهل‌ها و کافئین و داروهای شیمی درمانی

پیشگیری:

- ✓ اجتناب از عواملی که در بالا ذکر شد
- ✓ شستن مرتب دستها (اگر خود یا یکی از اطرافیان، مبتلا به این بیماری هستید)
- ✓ رعایت نکات بهداشتی هنگام آماده کردن غذا و عدم استفاده از غذاهای فاسد شده

عواقب مورد انتظار:

استفراغ و اسهال معمولاً در عرض ۲ تا ۵ روز برطرف می‌شود، اما بزرگسالان ممکن است تا یک هفته دچار ضعف و خستگی باشند.

درمان:


- ✓ درمان معمولاً حمایتی است (استراحت، مایعات)
- ✓ معمولاً هیچ دارویی مورد نیاز نیست اما اگر گاستروآنتریت شدید یا طولانی باشد داروی ضد تهوع و ضد اسهال تجویز می‌شود.
- ✓ اقدامات تشخیصی شامل آزمایش خون و مدفع



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان

بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب (ع)

اسهال و استفراغ (گاستروآنتریت)



واحد آموزش به بیمار

پاییز ۱۳۹۸

ویرایش دوم

✓ از مصرف خودسرانه‌ی آنتی بیوتیک و داروهای ضد اسهال اجتناب کنید

✓ از خوردن غذاهای پرادویه، سبزیجات و میوه‌های خام، سس سالاد، قهوه و شیر خودداری کنید

✓ در پارک به تابلوهای هشدار دهنده و مشخص کننده آب شرب و آب فضای سبز توجه نموده و از نوشیدن آب رودخانه، چاه، فضای سبز و آب‌های سطحی اجتناب کنید (در صورت عدم دسترسی به آب مطمئن، آن را جوشانیده و سپس مصرف کنید)

✓ از شستن میوه جات و سبزیجات و ظروف غذا در آبهای جاری پرهیز کنید

✓ شستشوی دستها قبل از تهیه غذا یا هنگام آماده کردن آن، بعد از دستشویی رفتن یا شستن کودک و قبل از خوردن غذا

✓ میوه جات و سبزیجات خام را قبل از مصرف، ضد عفونی و گندزدایی کنید

✓ از شنا در آب‌های آلوده یا غیر مطمئن پرهیز کنید

✓ کوتاه کردن ناخن‌ها و تمیز نگه داشتن آنها استفاده از توالت بهداشتی

می باشد، امکان دارد برای بعضی از باکتری‌ها درمان آنتی بیوتیکی اختصاصی مورد نیاز باشد.

در این شرایط به پزشک خود مراجعه نمائید:

✓ اگر علائم بیش از ۲ روز طول بکشد

✓ مشاهده خون یا مخاط در مدفوع

✓ تب ۳۸/۳ درجه یا بالاتر

✓ تورم شکم

✓ درد شدید شکم، خصوصاً دردی که از وسط شکم شروع شود و تدریجاً به قسمت پایین شکم در سمت راست تغییر مکان بدهد

✓ بازگشت استفراغ و اسهال پس از درمان

✓ مشاهده علائم کم آبی مثل خشکی دهان، پوست چروکیده، تشنجی زیاد، کاهش ادرار، ضعف و بی حالی

آموزش به بیمار:

✓ استراحت در رختخواب تا برطرف شدن علائم تهوع، استفراغ، اسهال و تب

✓ هرگز از فروشنده‌گان دوره گرد، مواد غذایی و خوراکی خریداری نکنید.

✓ مواد غذایی را از دسترس حشرات، جوندگان و سایر حیوانات دور نگهدارید.